

맵틸디노캡 유탁제 (상표) 해 모 아

유효성분 : meptyldinocap 24%
 기 타 : 용제, 계면활성제, 동결방지제, 소포제, 방부제, 증량제 76%
 계 통 : 디니트로페닐계

독 성 : 저독성

【적용병해충 및 사용량】

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안 전 사 용 기 준	
				시 기	횟 수
오 이	흰 가 루 병	발병초 10일간격 경엽처리	20mℓ	수확 2일전까지 사용	2회 이내
감(단감포함)				수확 21일전까지 사용	4회 이내
딸 기				수확 3일전까지 사용	2회 이내
참 외					3회 이내

【사용방법】

1. 흰가루병 발생이 많은 시에는 5일간격으로 2회 살포하십시오.

【특 징】

1. 이 농약은 흰가루병 전문약으로 타약제에 저항성이 발현된 지역에서도 잘 듣습니다.
2. 이 농약은 흰가루병 치료 전문약입니다. 예방용으로 뿌리시면 약효지속기간이 짧습니다.
3. 이 농약은 작물체 내에 침입한 흰가루병까지 치료 가능합니다.
4. 이 농약은 침달성이 약하므로 잎뒷면까지 골고루 문도록 살포하여야 합니다.

⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】

1. 내성균 출현을 방지하기 위하여 지나친 연용을 피하고 다른 약제와 교대로 살포하십시오.
2. 이 농약은 중복살포할 경우 약해의 우려가 있으므로 중복살포를 하지 마십시오.
3. 35℃ 이상고온기에는 약해의 위험이 있으므로 주의하십시오.
4. 등록된 작물 이외에는 절대 사용하지 마십시오.

⚠ 【안전 및 기타 주의사항】



1. 이 농약은 피부를 자극시킬 수 있고 알레르기를 일으킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리시되 작업후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오

【해독방법】

1. 피부에 묻었을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어내고, 의사의 진료를 받으십시오.