

파 목 사 돈 액 상 수 화 제
(상표) 클 립 톤

유효성분 : famoxadone 17.5%
기 타 : 계면활성제, 동결방지제, 증점제, 방부제, 증량제 82.5%
계 통 옥사졸린디온계

독 성 : 저독성

【적용병해충 및 사용량】

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안 전 사 용 기 준	
				시 기	횟 수
감 자	역 병	발병직전 7일간격	20ml	수확14일전까지 사용	4회 이내
	노 균 병	발병초 10일간격			2회 이내
배 추	뿌 리 흑 병	정식전 뿌리침지	100ml	정식전까지 사용	1회 이내
		정식전 토양분무 후 혼화처리			
양 파	노 균 병	발병초 7일간격	20ml	수확7일전까지 사용	3회 이내
고 추 (단고추류포함)	역 병	발병초 10일간격			2회 이내
토 마 토 (방울토마토포함)					

【사용방법】

1. 이 농약은 강우 등으로 병발생 위험이 높을 시 예방용으로 사용시 뛰어난 효과를 보입니다.

【특 징】

1. 이 농약은 예방 효과가 우수한 약제입니다.
2. 이 농약은 미토콘드리아에 작용하여 병원균의 호흡을 저해시킵니다.
3. 이 농약은 병원균의 생육단계 전반에 작용하므로 우수하고 안정적인 효과를 보입니다.
4. 이 농약은 큐티클층에 빠르게 침착, 일부 흡수된 후 꾸준히 용출되어 잔효력이 길고 내우성이 우수한 약제입니다.