

디티오피르유제

(상표) **디멘존**

유효성분 : dithiopyr 32%
 기 타 : 계면활성제, 용제, 증량제 68%
 계 통 : 피리딘계

독 성 : 저독성·어독성 II급

【적용대상 및 사용량】

작 물 명	적용잡초	사용적기 및 방법	물20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	
				약 량	살 포 량
한국잔디	일년생잡초	잡초 발생전 토양처리	15mℓ	150mℓ	200~300 ℓ

【사용방법】

- 봄처리 : 3월초~5월초 사이 잡초가 발아하기 전에 소정의 약량을 균일하게 뿌려 주십시오.
- 가을처리 : 새파아풀 등 가을잡초가 발생하기 직전에(9월초순경)소정의 약량을 균일하게 뿌려 주십시오.
- 날씨가 건조할 때에는 사용물량을 늘려 사용하십시오.

【특 징】

- 이 농약은 피리딘계의 잡초발생전 토양처리형 제초제입니다.
- 새파아풀과 일년생 화본과잡초 및 일년생 광엽잡초에 효과가 우수합니다.
- 이 농약은 약효지속효과가 길기 때문에 일반적인 잔디밭 조건에서 한번 처리로 오랫동안(2~4개월 정도) 잡초의 발생을 억제합니다.
- 이 농약은 토양흡착력이 강하고, 수용해성이 낮아 약제가 쉽게 유실되지 않아 환경에 안전합니다.
- 이 농약은 한국잔디에 안전성이 뛰어난 약제입니다.

⚠ 【약효·약해에 관한 주의사항】

- 이미 발생되어 있는 잡초에는 효과가 떨어지므로 약제 사용전에 이미 발생한 잡초를 제거한 후 처리하십시오.
- 고온기에 벤틀그라스 등 한지형잔디에 살포하면 약해 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 약액이 주변의 작물이나 나무에 비산될 경우 약해의 우려가 있으므로 비산되지 않도록 주의하여 살포하십시오.

⚠ 【안전 및 기타 주의사항】



- 이 농약은 피부를 자극시킬수 있고 알레르기를 일으킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리십시오.
- 이 농약은 0도(℃)이하에서 결빙될 우려가 있으므로 보관장소의 온도가 0도(℃)이하로 내려가지 않도록 주의하십시오. 저장 중 결빙된 제품은 상온에서 녹으면 일부 침전물이 발생할 수 있으나 잘 흔들어 사용하시면 효과에는 영향이 없습니다.

【해독방법】

- 피부에 묻었을 경우에는 즉시 물로 씻어내고 이상이 있을때는 의사의 진료를 받으십시오.